病治療學

(四十四) 葉勁秋編

同時柔軟。而凡受病之部分。俱能預防血液之凝滯。而無刺戟與助長體內生熱作用也 **尿後之疼痛。較排尿時尤劇。尿中往往否有血液。** 常困頓。終則尿道內或陰髮肛門之間。破爛而排出多量之膿汁也。凡患慢性淋者 胱之尖端兩鼠蹊部之間。〕腫大。有時小便不通此等症狀。 。遂見治愈。問或至於化膿。 意既爲溫熱療法·义有發菌之力·故用後即見充血著明減退。而漸趨於和緩。炎症 凡患本症者其肛門內及會陰均覺疼痛。 而諸症愈益增劇。熱度昇至攝氏四十 發攝氏三十八度以上之高熱 度左右。 攝護線部(在

保證實切有用信求務版出

治法自然以安靜為第一。陰囊肛門間。應施以冷罨或温罨法。 一方通以大便。若已

尿道狹窄 化膿。則當施以手術。 本症乃淋疾經過中。因戀痕收縮而徐徐發生o排出之尿線。懷相應於狹窄

\*\*\*\*\*\*\*\*\* 之程度而至細小の甚至自尿道口點觸漏出者刊之。至若尿閉。則有生命之危險也。

報識常學醫會社名又

來涵 李全安君

部制会 (基本) と (本本) と (本本

以四田時午至九上門 [時 後時診止號下時午診 問

啓處號掛

筆中生

(戊)急病隨請

第

(丁)膏丸方四元

楊志

C

(乙)門診一元

(内)出於四元

口從 多令進補 白菜蘿蔔 談到世 (湯士彦)

虧亂品關 損投的於 起。選冬

素(即維他命 Vitamine) 祗要 樣含有很豐富的(甲)(防止偏傳 樣含有很豐富的(甲)(防止偏傳 人物) · 哈哈哈。

南。 中的在。小姑珍期大江 中的在。小姑珍期大江 一个的在。小姑珍期大江

**憑盦詩**草

郷費在内。 質售七折。

□這些都是防病養生的妙質

TO SERVICE STATES

(功效)

氣虛吐血

一二枚。以水煎濃。

完)

湧出升 輸入之

服此

人参三錢加張

涡

途歸婦指痛疾婚解。

徑康女導苦病女诀

法治種各有內書本

0

大黄

**強何款**。 **毎服三** 公相得取出。於青石白中。以 木。知母黃柏末各一兩。共和 鏠 荷葉。茆根。 出大毒研細。 大吐血。及路血。服此即止 與前八妹和 百石白中。以木槌打 6 再用平胃 哉艸枳

四大祇特厚一洋全角洋收價奶大裝書 發報素商路三上

療自病百成造

方

胡豆無

合

無功用好・炭隔。内效分、鉄及投後最大なの少。如火水車。

四治 瘧疾力 (陳孔生) 一切件冷之物。惟以舊湯乘熱 飲之。最良。熱未全退。不宜 進食。服截瘧之藥。必俟發素 過後。(金鷄納霜丸)截瘧最靈 口治 小藥囊 

口葛可久治吐血 口口吐血與肺房 一內容之一

班

(6)白鳳裔 食之。與太平九消化九相問服。亦佳。

事治虚療嚴瘦。於 雄豬有體一條。於 的已見第六十二期本報 羊脊髓一條。 去骨取肉用酒一大碗。砂鍋内煮熟 五條。建運肉年斤

肺痨士效方(過点) 耳亦膏 の不容の 深得

取饭。復咸清般。寒冷恃甚朝雪片飄飄。寒冷恃甚